

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Экзодерил® , крем для наружного применения 10 мг/г

Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важная информация

- Сохраните данный листок-вкладыш. Возможно, вам понадобится перечитать его позже.
- Если у вас возникнут дополнительные вопросы, посоветуйтесь с врачом.
- В случае возникновения побочных эффектов, следует немедленно обратиться к врачу. Это также относится к новым побочным эффектам, не упомянутым в данной инструкции.
- Если вы не заметили улучшения в течении 4-х недель или заметили ухудшение – обратитесь к врачу.

СОСТАВ

1 г крема содержит:

Активное вещество: нафтифина гидрохлорид – 10 мг.

Вспомогательные вещества: натрия гидроксид, спирт бензиловый, сорбитанстеарат, цетилпальмитат, спирт цетиловый, спирт стеариловый, полисорбат 60, изопропилмиристанат, вода очищенная.

ОПИСАНИЕ

Белый, однородный или немного створоженный, блестящий крем со слабым характерным запахом.

ФОРМА ВЫПУСКА

В тубах по 15 и 30 г, 1 туба с инструкцией по медицинскому применению в пачке картонной.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Экзодерил содержит активное вещество нафтифин и предназначен для наружного применения при грибковых инфекциях.

Экзодерил эффективен против дерматофитов, умеренно активен против дрожжевых, плесневых и других грибов (e.g. *Sporothrix schenckii*).

Он также проявляет антибактериальную активность в отношении различных микроорганизмов, которые часто сопутствуют микозам.


При клиническом применении было отмечено противовоспалительное действие нафтифина, благодаря которому быстро исчезают признаки воспаления (покраснение, отек, шелушение) и, особенно, зуд.

Экзодерил применяется для местного лечения грибковых инфекций, вызванных возбудителями, чувствительными к нафтифину:

- грибковые инфекции кожи и кожных складок с сопутствующим зудом или без него;
- кожные кандидозы;
- отрубевидный лишай.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность к нафтифину, пропиленгликолю или другим вспомогательным веществам препарата.



ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Крем Экзодерил не предназначен для применения в офтальмологии.

Препарат содержит цетиловый и стеариловый спирты, которые могут вызывать местные кожные реакции (напр., контактный дерматит).

1 г крема также содержит 10 мг бензилового спирта в качестве консерванта.

Крем не фототоксичен и не вызывает фотосенсибилизации.

БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ

Если вы беременны или кормите грудью, или если вы подозреваете, что вы беременны или собираетесь забеременеть, проконсультируйтесь, прежде чем применять это лекарство, с лечащим врачом. В целях предосторожности следует избегать применения Экзодерила во время беременности и в период кормления грудью.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И РАБОТЕ С МЕХАНИЗМАМИ

До настоящего времени сообщения о влиянии не поступали.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Экзодерил предназначен только для наружного применения на коже. Применяйте это лекарство так, как было предписано врачом или фармацевтом.

Дозирование

Для лечения грибковых инфекций кожи применяйте один раз в сутки.

Пораженную кожу и прилегающие к ней участки очистите, высушите, затем мягко массируя, вотрите крем.

Избегайте попадания в глаза или на слизистые оболочки.

Дети и подростки: безопасность и эффективность нафтифина у детей и подростков до 18 лет не доказана (опыт применения недостаточен).

Пациенты с почечной или печеночной недостаточностью: коррекции дозы не требуется.

Пожилые пациенты: коррекции дозы не требуется.

Длительность применения

Для предотвращения рецидива инфекции лечение продолжайте еще не менее двух недель после клинического выздоровления.


Чтобы выздороветь как можно быстрее и для профилактики повторного заражения соблюдайте следующие правила:

Ежедневно меняйте одежду и белье, которые вступают в контакт с больной кожей. Не носите жесткую плотную воздухо непроницаемую одежду и обувь (например, носки из синтетических тканей, тесные туфли). Следует также тщательно высушивать больную кожу после мытья. Тряпку для мытья посуды и полотенца следует менять ежедневно. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и, особенно, чтобы исключить повторное заражение, у себя дома, в ванной комнате, в отеле, бассейне не ходите босиком.

Сауну и баню можно посещать только после выздоровления от грибкового заболевания.

Чистая, здоровая и сухая кожа это лучшая защита от грибковых инфекций.

ПЕРЕДОЗИРОВКА



Острая передозировка и возникновение опасных для жизни осложнений при наружном применении нафтифина маловероятны.

В случае случайного приема внутрь обратитесь к врачу. Рекомендуется соответствующее симптоматическое лечение.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по использованию этого препарата, обратитесь к вашему врачу или спросите у фармацевта.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Как все лекарства, Экзодерил может вызывать нежелательные эффекты, хотя развиваются они не у каждого. Частота побочных эффектов неизвестна. В отдельных случаях возможно возникновение ощущения сухости, жжения или покраснение.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Если вы принимаете, планируете принимать или недавно принимали какие-либо другие лекарства, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

Взаимодействия с другими лекарственными веществами или алкоголем не отмечены.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

Экзодерил наносят неразбавленным и не смешивают с другими препаратами для наружного применения, поскольку из-за сниженной концентрации эффективность активного вещества может быть недостаточной.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 30°C в недоступном для детей месте.

Вскрытую тубу хранить не более 28 дней при температуре не выше 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Отпускается без рецепта.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Сандоз ГмБХ, Биохемиштрассе 10, А-6250 Кундль, Австрия;

произведено Мерк КГаА и Ко. Верк Шпитталь, Австрия.