

**ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению (листок-вкладыш)
лекарственного препарата

ПИМАФУЦИН®

суппозитории вагинальные 100 мг

натамицин

Данная инструкция содержит важную информацию. Внимательно прочтите ее до начала применения препарата.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по применению препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.
- Данный лекарственный препарат назначен лично Вам. Не передавайте его другим людям. Препарат может причинить им вред, даже если их симптомы такие же, как у Вас.
- Если у Вас возникнет какой-либо побочный эффект или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту (см. раздел 4).

Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:

1. Что представляет собой препарат Пимафуцин® суппозитории и для чего его применяют
2. Что необходимо знать перед началом применения препарата Пимафуцин® суппозитории
3. Как следует применять препарат Пимафуцин® суппозитории
4. Возможные нежелательные реакции
5. Как следует хранить препарат Пимафуцин® суппозитории
6. Содержимое упаковки и другая информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ ПИМАФУЦИН® СУППОЗИТОРИИ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Суппозитории Пимафуцин® применяются для местного лечения вагинальных инфекций, вызванных дрожжами *Candida albicans*.

Натамицин, действующее вещество суппозиторий Пимафуцин®, является антимикотиком и эффективен против патогенных грибков, особенно дрожжей рода *Candida*, которые вызывают заболевание под названием кандидоз. Натамицин показан для местного применения и не всасывается через кожу или слизистые оболочки.

Суппозитории Пимафуцин® под действием температуры тела быстро растворяются, образуя пенную массу, что способствует равномерному распределению активной субстанции.

2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПИМАФУЦИН® СУППОЗИТОРИИ

Не применяйте суппозитории Пимафуцин®:

- если у Вас аллергия на натамицин или другие компоненты данного лекарственного препарата, перечисленные в разделе 6.

Особые указания и меры предосторожности

В период менструаций терапию суппозиториями прерывают. В период лечения суппозиториями нет необходимости в исключении половых контактов. Однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и, в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения препаратом Пимафуцин®. Также следует предусмотреть использование в период лечения барьерных контрацептивов.

Применение у пациентов с нарушенной функцией печени или почек

Пимафуцин® действует местно. Системная абсорбция действующего вещества практически отсутствует, поэтому если у Вас нарушена функция печени и/или почек, изменений режима дозирования не требуется.

Применение в педиатрической или гериатрической практике

Применение препарата возможно в любом возрасте по стандартной схеме.

Применение суппозиториев Пимафуцин® с другими лекарственными средствами

Лекарственное взаимодействие препарата Пимафуцин® не описано.

Вещества, обладающие окислительными свойствами, такие как пероксиды, перманганат, йод, гипохлориты и т.д., могут инактивировать натамицин.

Беременность и лактация

В случае беременности или кормления грудью, а также при предполагаемой или планируемой беременности необходимо до применения препарата проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Суппозитории Пимафуцин® могут применяться во время беременности и грудного вскармливания.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами

Суппозитории Пимафуцин® не влияют на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Компоненты суппозиториев Пимафуцин®

Суппозитории Пимафуцин® содержат цетиловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).


3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ ПИМАФУЦИН® СУППОЗИТОРИИ

Всегда применяйте препарат в точном соответствии с рекомендациями врача или фармацевта. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Применять по 1 суппозиторию в течение 3-6 дней. Суппозиторий вводят во влагалище в положении лежа, как можно глубже, 1 раз в сутки на ночь.

Не применять препарат во время менструации. Лечение следует планировать так, чтобы начать его после менструации или за достаточное время до ее начала.

Суппозитории Пимафуцин® не оставляют следов на нижнем белье.

**Если Вы забыли применить суппозитории Пимафуцин®:**

Если Вы забыли применить препарат Пимафуцин®, не используйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Прерывание лечения суппозиториями Пимафуцин®

Не прерывайте лечение без предварительной консультации с врачом. Если Вы прекратите применение препарата, симптомы могут вернуться.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по применению препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Как и другие лекарственные средства, данный препарат может вызывать побочные эффекты, однако они возникают не у всех пациентов.

Суппозитории Пимафуцин® обычно хорошо переносятся. Редко (не более чем у 1 человека из 1 000) могут возникать реакции гиперчувствительности (легкое раздражение, ощущение жжения), которые проходят самостоятельно.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявляемых в Республике Беларусь (<https://www.rceth.by>).

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ ПИМАФУЦИН® СУППОЗИТОРИИ

Хранить при температуре 15-25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности считается последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте остатки неиспользованного препарата в канализацию или с бытовым мусором. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Препарат Пимафуцин® содержит:

Действующее вещество: натамицин. 1 суппозиторий содержит 100 мг натамицина.

Вспомогательные вещества: спирт цетиловый, твердый жир, сорбитан триолеат, полисорбат 80, натрия гидрокарбонат, адипиновая кислота.

Внешний вид и содержимое упаковки препарата Пимафуцин® суппозитории

Суппозитории вагинальные.

Суппозитории торпедовидной формы от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого с коричневатым оттенком цвета.

Первичная упаковка: 3 суппозитория вагинальных в стрип из алюминиевой фольги.

Вторичная упаковка: по 1 или 2 стрипа вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

ЧЕПЛАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ

Цигельхоф 24, 17489 Грайфсвальд, Германия

Сведения о производителе

Темплер Италиа С.р.Л.

Виа деле Индустри, 2

20061 Каругате (Ми), Италия

Данный листок-вкладыш пересмотрен

XX.XX.XXXX

