

11.04.2017
[Signature]

НД РБ 1
6193 - 2017

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Торговое название лекарственного средства: Тонзипрет®

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические для рассасывания

СОСТАВ:

1 таблетка содержит:

Capsicum annuum (Перец стручковый)	Dil. D3	75,0 мг
Guaiacum (Гваяковое дерево)	Dil. D3	75,0 мг
Phytolacca americana (Лаконос американский)	Ø	50,0 мг

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 22.06.2017 № 698

Вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, магния стеарат, картофельный крахмал.

ОПИСАНИЕ

Светло-бежевые, круглые, плоские таблетки.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Гомеопатическое лекарственное средство. Код АТХ: V03AX. Прочие лекарственные средства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению.
Область в рамках гомеопатического применения включает симптоматическое лечение воспалительных заболеваний глотки, горла или миндалин (тонзиллит).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. Беременность и период лактации.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Препарат противопоказан для приема женщинами во время беременности и кормления грудью. Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.



ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В редких случаях могут развиваться тошнота и расстройства желудочно-кишечного тракта, в очень редких случаях - гиперчувствительность / аллергические реакции.

При первых симптомах аллергической реакции следует немедленно прекратить прием таблеток Тонзипрет.

На фоне применения гомеопатических средств возможно временное обострение симптоматики. В этом случае необходимо прекратить прием препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Если какие-либо из указанных побочных эффектов являются довольно сильными или Вы наблюдаете побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Если врач не назначил другой дозировки:

Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать: При острых состояниях каждые полчаса или час, но не более 12 раз в день по 1 таблетке. При хронических состояниях 1-3 раза в день по 1 таблетке.

Детям от 6 до 11 лет суточная доза не должна превышать $\frac{2}{3}$ от взрослой дозы. При острых симптомах по 1 таблетке не более 8 раз в день. При хронических состояниях – по 1 таблетке 2 раза в день.

Детям от 1 года до 5 лет суточная доза не должна превышать половины от взрослой дозы. При острых симптомах по 1 таблетке не более 6 раз в день. При хронических состояниях – по 1 таблетке 1-2 раза в день.

Таблетки следует медленно рассасывать во рту до полного растворения.

Для детей от 1 года до 5 лет перед употреблением рекомендовано растворить таблетку в одной столовой ложке воды.

Гомеопатические препараты не следует принимать длительное время без консультации с врачом.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует. Действие гомеопатического средства может уменьшиться при несоблюдении правил здорового образа жизни. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Отсутствуют достаточные данные о применении препарата у детей раннего возраста. Препарат противопоказан для применения у детей до 1 года.


В случае развития стойких или неясных симптомов, при появлении новых симптомов, а также при подъеме температуры, сохраняющемся в течение более 3 дней или достигающем 39°C и выше, следует обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит лактозу. Поэтому его не следует назначать пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, врожденной лактазной недостаточностью или глюкоза-галактозной мальабсорбцией.

Препарат в рекомендуемых дозировках не снижает способности управлять транспортом и механизмами

Примечание для больных сахарным диабетом:

1 таблетка Тонзипрета содержит 0,02 хлебных единиц (ХЕ).



ПЕРЕДОЗИРОВКА

При употреблении больших доз лекарственного препарата у пациентов с непереносимостью лактозы возможно развитие расстройства желудочно-кишечного тракта или диареи. Лечение симптоматическое.

ФОРМА ВЫПУСКА

Упаковка по 50 таблеток

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ

4 года.

Не допускается применение препарата после истечения срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БИОНОРИКА СЕ

Кершенштайнерштрассе 11-15,

92318 Ноймаркт

Германия

Представительство в Республике Беларусь

220095 г. Минск, пр. Рокоссовского 64, пом.2 Н

тел/факс (+375 17) 211-40-08, 211-40-13

e-mail office@bionorica.by