

НД РБ


Листок-вкладыш лекарственного средства 6695 - 2018

Уважаемый пациент,

Внимательно прочитайте инструкцию перед приемом препарата.  
Сохраните инструкцию, возможно, Вам потребуется перечитать ее снова.  
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

**Климадинон® Уно****Растительное лекарственное средство для облегчения симптомов менопаузы****Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

**Состав**

1 таблетка содержит:

6,5 мг сухого экстракта корневища цимицифуги (*Cimicifuga rhizome*) (4.5-8.5:1)  
(экстрагент: этанол 60 % (об/об)).

*Вспомогательные ингредиенты:* целлюлоза, порошок, кремния диоксид коллоидный безводный, лактоза моногидрат, магния стеарат, кукурузный крахмал, натрия крахмалгликолят (тип А), гипромеллоза, макрогол 4000, титана диоксид (Е 171), кальция гидрофосфат дигидрат, железа оксид красный (Е 172), железа оксид желтый (Е 172)

**Описание**

Круглые таблетки двояковыпуклой формы терракотового (светло-коричневого) цвета с риской на одной стороне.

**Производитель**

БИОНОРИКА СЕ  
Кершенштайнерштрассе 11-15,  
92318 Ноймаркт

Представительство в Республике Беларусь  
220095 г. Минск, пр. Рокоссовского 64, пом.2 Н  
тел/факс (+375 17) 342-40-08, 271-40-13  
e-mail office@bionorica.by


**Фармакотерапевтическая группа**

Код АТС: G02СХ. Прочие средства для применения в гинекологии

**Показания к применению**

Растительное лекарственное средство для облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы и повышенная потливость.

## Противопоказания



Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

## Особые предостережения и меры предосторожности

6695 - 2018

Пациентам, имеющим в анамнезе заболевания печени, не следует принимать Климадинон Уно без консультации с врачом.

Если у пациента развиваются признаки и симптомы, указывающие на поражение печени (усталость, потеря аппетита, пожелтение кожи и глаз, сильные боли в верхней части живота, тошнота, рвота или темная моча), следует прекратить приём таблеток Климадинон Уно и немедленно обратиться к врачу.

Не следует принимать вместе с эстрогенами, если это не назначено врачом.

Пациентам, которые прошли или проходят лечение (курс лечения) против рака молочной железы или других гормонозависимых опухолей, не следует принимать Климадинон Уно без консультации у врача.

В состав лекарственного средства входит лактоза. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью сахаров не следует принимать данный препарат без консультации у врача.

При появлении нарушений цикла или повторных менструаций, а так же в случае длительных, новых и неясных симптомов, следует обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать о заболевании, требующем медицинского вмешательства.

Если какое-либо побочное действие приобретает серьезный характер или если наблюдается ухудшение симптоматики во время приема препарата, необходимо проконсультироваться с врачом.

*Примечание для больных сахарным диабетом:*

Разовая доза препарата (1 таблетка) содержит в среднем 0,01 «хлебных единиц» (ХЕ).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не известны

## Применение в период беременности и кормления грудью

Исследования данного лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не проводились. Из-за отсутствия соответствующих исследований не рекомендуется применение препарата в период беременности и лактации.

## Влияние на способность управлять автомобилем или механизмами

Особых мер предосторожности не требуется.

## Способ применения и дозы

Принимается внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.

Таблетки следует принимать с достаточным количеством жидкости, по возможности, всегда в одно и то же время суток (предпочтительно вечером). Не разжевывать и не рассасывать.

Если симптомы сохраняются на протяжении курса лечения, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Не следует принимать Климадинон Уно дольше 6 месяцев без консультации врача.

### Побочное действие

Прием препаратов, содержащих цимицифугу, может сопровождаться токсичностью (включая гепатит, желтуху, изменения лабораторных показателей печени). Частота не известна.



Возможно возникновение кожных реакций (крапивница, зуд, экзантема), отек лица, периферические отёки, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта (например, диспепсические расстройства, диарея). Частота не известна.

При появлении побочного действия, не описанного в данной инструкции, пожалуйста, обратитесь к врачу.

### Передозировка

Случаи передозировки препарата описаны не были. В случае употребления препарата в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.

### Условия хранения и срок годности

Срок годности указан на упаковке.

Не применять после окончания срока годности!

Хранить при температуре не выше 30°C.

### Форма выпуска и упаковка

По 15 таблеток в блистер. По 2 или 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

### Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача