


**ЛЮГОЛЯ РАСТВОР - ЖФФ
(Lugoli solutio - ZFF)**



ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 г препарата содержит йода 0.01 г, калия йодида 0.02 г;
вспомогательные вещества: глицерин, вода очищенная.

Лекарственная форма. Раствор.

Прозрачная сиропообразная жидкость красно-бурого цвета с запахом йода.

Фармакотерапевтическая группа.

Препараты, применяющиеся при заболеваниях горла. Антисептики.
 Код ATC R02A A20.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Основным действующим веществом является молекулярный йод, оказывающий антисептический и местнораздражающий эффект.

Оказывает бактерицидное действие в отношении грамотрицательной и грамположительной флоры, а также действует на патогенные грибы (в т.ч. дрожжи); *Staphylococcus* spp. более устойчивы к йоду, однако при длительном применении препарата в 80 % случаев отмечается подавление стафилококковой флоры; *Pseudomonas aeruginosa* устойчива к действию препарата. При нанесении на обширные поверхности кожи и слизистых оболочек йод оказывает резорбтивное действие: участвует в синтезе T_3 и T_4 .

Входящий в состав калия йодид улучшает растворение йода в воде, а глицерин оказывает смягчающее действие.

Фармакокинетика.

Резорбция йода через кожу и слизистые оболочки полости рта незначительная. При контакте со слизистыми оболочками на 30 % превращается в йодиды. При случайном проглатывании йод быстро всасывается. Абсорбированная часть хорошо всасывается в органы и ткани. Выводится главным образом почками, в меньшей степени кишечником и с потом. Проникает в грудное молоко.

Показания к применению.

Воспалительные процессы слизистой оболочки глотки: тонзиллит, фарингит.


Противопоказания.

- Повышенная чувствительность к препарату;
- Гипертриеоз;
- Туберкулез легких;
- Геморрагические диатезы;
- Тяжелые заболевания печени и почек;
- Детский возраст до 5 лет.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Не допускать попадания в глаза.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может навредить здоровью.



6797 - 2013

Особые предостережения.

Йод проникает в грудное молоко и потенциально может оказывать влияние на функцию щитовидной железы у детей, находящихся на грудном вскармливании.
Солнечный свет и температура выше 40 °C ускоряет распад активного йода.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Возможно применение по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Не применять детям до 5 лет.

Способ применения и дозы.

Для наружного применения!

Тампоном, смоченным препаратом, смазывают слизистую оболочку глотки 3-4 раза в сутки.

Продолжительность курса лечения зависит от характера заболевания и его выраженности.

Передозировка.

Симптомы: раздражение верхних дыхательных путей (ожог, ларинго- и бронхоспазм); при попадании внутрь – раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, гемолиз, гемоглобинурия.

Лечение: промывание желудка 0,5 % раствором натрия тиосульфата, растворами натрия гидрокарбоната, внутривенно 30 % натрия тиосульфат – до 300 мл.

Побочные эффекты.

При длительном применении возможно явление йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюноотделение, сыпь на коже, мышечная слабость, заторможенность).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Йод инактивируется натрия тиосульфатом.

Содержащийся в составе препарата йод окисляет металлы. Фармацевтически не совместим с эфирными маслами, растворами аммиака. Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляет антисептическую активность лекарственного средства.

В случае попадания препарата внутрь возможно снижение действия лекарственных средств, подавляющих функцию щитовидной железы, а также могут изменяться показатели функции щитовидной железы.

Препараты йода могут усиливать раздражающее действие некоторых лекарственных средств на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Срок годности. 3 года.

Препарат не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 25 г в стеклянных флаконах в упаковке № 1.

СОГЛАСОВАНО
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь

НД РБ 6797 - 2013

Категория отпуска.

Без рецепта.

Название и адрес производителя.

ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика».
Украина, 10014, г. Житомир, ул. Лермонтовская, 5.