


6843 - 2018

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
ESCUVEN-TERNOPHARM



Общая характеристика:

основные физико-химические свойства: бесцветный или с желтоватым оттенком слегка опалесцирующий прозрачный гомогенный гель;

международное непатентованное название: отсутствует;

состав: 1 г геля содержит β -эсцина аморфного – 0,01 г;

вспомогательные вещества: карбомер, пропиленгликоль, триэтаноламин, метилпарабен (Е 218), спирт этиловый 96 %, вода очищенная.

Форма выпуска. Гель 1 % для наружного применения.

Фармакотерапевтическая группа. Ангиопротекторы. Прочие средства, снижающие проницаемость капилляров. Код АТС С05С Х03.

Фармакологические свойства. Эсцин – это естественная смесь тритерпеновых сапонинов, полученных из семян конского каштана (*Aesculus hippocastanum L.*). Точный механизм действия не известен, но доклинические и клинические фармакологические исследования показали, что эсцин влияет на тонус венозной стенки и скорость капиллярной фильтрации, способствует уменьшению отека.

Показания к применению. Применяется для симптоматического лечения начальной стадии хронической венозной недостаточности (дискомфорта и ощущения тяжести в ногах), для уменьшения симптомов ушибов (местного отека и гематомы).

Применение данного лекарственного средства основано исключительно на опыте традиционного многолетнего использования.

Способ применения и дозировка. Гель наносить тонким слоем на поврежденный участок кожи и вокруг нее 2-3 раза в сутки. Не следует втирать.

При варикозном расширении вен рекомендуется одновременное применение эластичного биндажа или эластичных чулок.

Продолжительность лечения зависит от выраженности терапевтического эффекта. Если после 14 дней терапии улучшения не наступает, нужно обратиться к врачу.

Побочное действие.

Возможны реакции гиперчувствительности, включая дерматит, в том числе аллергический, кожная сыпь, зуд, эритема, чувство жжения кожи, бронхоспазм.

В случае возникновения таких реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка. Нет данных относительно передозировки.

Меры предосторожности. Не следует наносить гель на воспаленную кожу, открытые раны и слизистые оболочки. Не втирать при нанесении. При появлении воспалительных изменений на коже, развитии язв, сердечной или почечной недостаточности, выраженных симптомов венозной недостаточности (отек, изменение цвета кожи, подкожное уплотнение, ощущение напряжения и боль), особенно на одной конечности, необходимо обратиться к врачу (следует исключить тромбоз вен нижних конечностей).

Применение геля при варикозном заболевании вен не заменяет других профилактических или лечебных мероприятий (например, ношение поддерживающих эластичных чулок, обливание холодной водой).

Гель содержит метилпарабен (Е 218), который может вызвать аллергическую реакцию (в том числе отсроченную), а в исключительных случаях – бронхоспазм, и пропиленгликоль (Е 1520), способный вызвать раздражение кожи.

Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием адекватных данных применение во время беременности и лактации не рекомендовано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Опыта применения препарата детям недостаточно, поэтому не рекомендуется применять его пациентам этой возрастной категории.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Неизвестно. Не рекомендуется применять гель на одном участке кожи вместе с другими средствами для местного применения.

Условия хранения и срок годности. При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года. *Нельзя применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!*

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г в тубе алюминиевой, помещенной вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

Информация о производителе. ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;
тел./факс +38 (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua