

Листок-вкладыш
Информация для пациентов

Септолете® плюс ментол таблетки для рассасывания
бензокаин / цетилпиридиния хлорид

Двойной эффект
При боли в горле
Антисептик

Торговое название

Септолете® плюс ментол

Общая характеристика

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки для рассасывания с гладкой поверхностью, покрытые оболочкой голубого цвета.

Состав

1 таблетка для рассасывания содержит 5 мг бензокаина и 1 мг цетилпиридиния хлорида (в форме моногидрата).

Вспомогательные вещества: левоментол, мяты перечной масло, мальтит жидкий, маннит, глицерин, касторовое масло, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, краситель патентованный голубой V (E 131), титана диоксид (E 171), капол 600 фарма, повидон, мальтит.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания.

Код классификации лекарственного средства


Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики.
Код АТХ R02AA06.

Фармакологические свойства

Таблетки для рассасывания Септолете® плюс ментол обладают двойным эффектом - оказывают местное обезболивающее и противомикробное действие.

В состав препарата включен антисептик - цетилпиридиния хлорид, который вызывает гибель большинства бактерий и грибов и ингибирует рост вирусов. Таблетки для рассасывания дезинфицируют полость рта и горло, тем самым, облегчая боль и чувство дискомфорта, связанные с воспалительным процессом, а также предотвращают развитие более тяжелого бактериального воспаления.

Благодаря хорошим смачивающим свойствам и низкому поверхностному натяжению цетилпиридиния хлорид проникает в труднодоступные места - складки и карманы слизистой оболочки - и останавливает рост бактерий.



Бензокаин относится к местным анестетикам, применяется для облегчения боли при глотании, которая часто сопровождается инфекцией и воспалением в полости рта и горле.

Показания к применению

Препарат Септолете® плюс ментол рекомендован для симптоматического облегчения боли, чувства жжения (сухости) и першения в горле:

- при умеренных инфекциях полости рта и горла (фарингит, ларингит);
- при воспалении десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит);
- при простудных заболеваниях и гриппе.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая дозировка для *детей от 6 до 12 лет* - до 4 таблеток для рассасывания в день. Рассасывать по 1 таблетке каждые 4 часа.

Рекомендуемая дозировка для *детей старше 12 лет и взрослых* - до 8 таблеток для рассасывания в день. Рассасывать по 1 таблетке каждые 2 – 3 часа.

Таблетки для рассасывания Септолете® плюс ментол не рекомендованы детям младше 6 лет.

Не принимайте Септолете® плюс ментол непосредственно перед едой или во время приема пищи.

Не следует принимать пищу или употреблять жидкость как минимум в течение одного часа после приема препарата.

Не следует принимать двойную дозу препарата с целью компенсировать пропущенный прием.

Побочное действие

Как и все препараты, таблетки для рассасывания Септолете® плюс ментол в отдельных случаях могут вызывать нежелательные явления.

Нарушения со стороны пищеварительной системы

Редко (1 - 10 случаев из 10 000):

- желудочно-кишечные расстройства (как правило, при превышении рекомендованных доз).

Нарушения со стороны иммунной системы

Нечасто (1 - 10 случаев из 1 000):

- реакции гиперчувствительности.

Реакции гиперчувствительности в форме контактного дерматита возникают менее чем у 1 % пациентов. У лиц с гиперчувствительностью к бензокаину (также известен как эфир 4-аминобензойной кислоты) возможна гиперчувствительность к другим местным анестетикам этого же класса (например, прокаину, тетракаину).

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы

Частота не известна (не может быть оценена по доступным данным)

- метгемоглобинемия.

Если какая-либо из описанных побочных реакций становится серьезной, а также при появлении побочной реакции, не упомянутой в листке-вкладыше, пожалуйста, обратитесь к врачу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к бензокаину, цетилпиридиния хлориду или любому из вспомогательных компонентов препарата.

Передозировка

Учитывая количества действующих веществ в каждой таблетке для рассасывания, риск передозировки минимален.

При приеме доз, превышающих рекомендуемые, могут возникнуть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, рвота и диарея. В указанном случае следует прекратить прием препарата, выпить большое количество воды или молока и проконсультироваться со специалистом.

При приеме доз препарата, превышающих рекомендуемые, возможно развитие метгемоглобинемии. При наличии таких симптомов, как головная боль, повышенная утомляемость, головокружение и затруднение дыхания, следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

Меры предосторожности

- Таблетки для рассасывания Септолете® плюс ментол **не рекомендуются** детям младше 6 лет.

- Препарат следует принимать с осторожностью при наличии **открытых ран в полости рта** (например, после удаления зуба или операции по удалению миндалин), поскольку цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран.

- В случае **тяжелых инфекций, сопровождающихся высокой температурой, головной болью и рвотой**, следует обратиться к врачу, особенно, если состояние не улучшается в течение 3 дней.

- Септолете® плюс ментол следует принимать с осторожностью пациентам с **бронхиальной астмой, предрасположенностью к бронхоспазму** (сужение дыхательных путей) или **ларингоспазму** (внезапный спазм голосовых связок), приступами **судорог** в анамнезе.

- После приема препарата возможно появление преходящего чувства жжения, онемения в полости рта или горла, нарушение глотательного рефлекса, вследствие чего возможно затруднение приема пищи или жидкости, повышается риск прикусывания губ и/или языка. **Принимать пищу или пить воду сразу после приема препарата не рекомендуется.**

- Пациентам с **сахарным диабетом** следует иметь в виду, что в каждой таблетке содержится около 1 г мальтита. Однако, из-за медленного гидролиза и плохого всасывания в желудочно-кишечном тракте мальтит оказывает незначительный эффект на уровень сахара в крови.

Не следует превышать рекомендуемые дозы.

Прием с пищей и напитками

Не рекомендуется Септолете® плюс ментол запивать молоком, так как возможно снижение антимикробной активности.

Особая информация о некоторых ингредиентах препарата

Таблетки для рассасывания Септолете® плюс ментол содержат мальтит и жидкий мальтит. Пациенты с редкими наследственными нарушениями, связанными с непереносимостью некоторых сахаров, перед началом приема этого лекарственного средства должны проконсультироваться с врачом.

Беременность и период лактации

Перед приемом каких-либо препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Так как данные по безопасности применения во время беременности и в период грудного вскармливания ограничены, то указанной категории пациентов принимать препарат не рекомендуется.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Не сообщалось о влиянии Септолете® плюс ментол на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Перед началом приёма необходимо сообщить врачу о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо лекарственные средства. Неизвестно влияние препарата на эффективность других лекарственных средств.

Условия и срок хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке с целью защиты от влаги и света. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

18 таблеток для рассасывания в блистерах из ПВХ/ПВДХ пленки и алюминиевой фольги (2 блистера по 9 таблеток для рассасывания) в картонной коробке с листком-вкладышем.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.