

**Инструкция
по медицинскому применению лекарственного препарата
Вагинорм-С® / Vaginorm-C**

Торговое название: Вагинорм-С®

Международное непатентованное название: аскорбиновая кислота.

Лекарственная форма: таблетки вагинальные.

Состав 1 вагинальной таблетки:

Активное вещество: аскорбиновая кислота - 250 мг;

Вспомогательные вещества: полиметилсилоксан - 10 мг, лактозы моногидрат - 670 мг, ги-
промеллоза - 60 мг, магния стеарат - 10 мг.

Описание:

Овальные таблетки от белого цвета до белого со светло-желтым оттенком.

Фармакотерапевтическая группа:

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии.

Код ATХ: G01AD03

Фармакологическое действие

Аскорбиновая кислота снижает pH влагалища, ингибируя рост бактерий, и способствует восстановлению и поддержанию нормальных показателей pH и флоры влагалища (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus gasseri*). Таким образом, при снижении pH влагалища в течение нескольких дней происходит выраженное подавление роста анаэробных бактерий, а также восстановление нормальной флоры (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus gasseri*).

Фармакокинетика

В системном кровотоке обнаруживается в незначительном количестве, выводится через почки.

Показания:

- хронический или рецидивирующий вагинит (бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит), обусловленный анаэробной флорой (вследствие измененного pH влагалища);
- для нормализации нарушенной микрофлоры влагалища.

Противопоказания:

- гиперчувствительность к любому из компонентов;
- кандидозный вульвовагинит.

Применение при беременности и лактации

Не противопоказан во время беременности и лактации.

Пациентка должна быть проинформирована о необходимости тщательного мытья рук перед применением препарата с целью уменьшения риска восходящей инфекции.

Способ применения и дозы


Интравагинально. 1 вагинальную таблетку вводят во влагалище, лежа на спине при слегка согнутых ногах, 1 раз вечером перед сном. Курс лечения составляет 6 дней. Возможны повторные курсы лечения. При необходимости, курс терапии можно продлить на более длительный срок.

Побочное действие

Препарат хорошо переносится.

Очень редко (<1/10000 случаев) - гиперчувствительность к одному из компонентов препарата.

Редко (< 1/100, ≥ 1/1000 случаев) возможно жжение или зуд во влагалище, усиление слизистых выделений, гиперемия, отечность вульвы. В таких случаях лечение препаратом необходимо прекратить.



Известно, что примерно у 10% всех женщин наблюдается бессимптомная дрожжевая грибковая инфекция. При нарушении вагинальной флоры с высокой концентрацией специфических анаэробов может подавляться размножение дрожжевых грибков, поскольку эти анаэрообы продуцируют такие вещества, как дифениламин, ингибирующих размножение дрожжевых грибков. После нормализации вагинальной флоры, размножение дрожжевых грибков, в некоторых случаях, может усиливаться, что может вызвать появление симптомов грибковой инфекции.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Салицилаты стимулируют процесс выведения витамина С из организма. Эстрогены улучшают биодоступность витамина С. Витамин С снижает активность антикоагулянтов.

Особые указания

Препарат не угнетает рост грибковой флоры влагалища. Перерывы в применении препарата Вагинорм-С® в связи с менструальными кровотечениями не обязательны. Витамин С изменяет картину содержания глюкозы в моче, так же как и картину содержания трансамина, лактата дегидрогеназы и билирубина в сыворотке крови. Такие проявления, как жжение и зуд, могут быть обусловлены наличием сопутствующей грибковой инфекции. Поэтому при появлении данных симптомов следует провести анализ для исключения грибковой инфекции.

Форма выпуска

Вагинальные таблетки 250 мг.

По 6 вагинальных таблеток в блистер из ПВХ-ПВДХ/ Ал.

По 1 блистеру вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Полихем С.А.

50, Валь Флери,

Л-1526, Люксембург

Производитель

Артезан Фарма ГмбХ и Ко. КГ

Вендландштрассе 1,

29439 Люхов, Германия

Сообщить в Abbott о нежелательном явлении или о жалобе на качество при применении лекарственного препарата Вы можете по телефонам (круглосуточно) или по адресу:

Украина, 01032, Киев, ул. Жилянская 110, 2 этаж, тел. +380 44 498 6080 (для Украины и других стран СНГ);

Республика Беларусь, 220035, Минск, 1-ый Загородный пер., д.20, офис 1503, представительство АО «Abbott Laboratories S.A.» (Швейцарская Конфедерация), тел +375 17 256 7920;

Республика Узбекистан, 100015, Ташкент, ул. Ойбек, 38а; тел. +998 71 129 0550.

