


ІІД РБ



ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЭСКУВИТ
(ESKUVIT)

Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, зеленого цвета, круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, на разломе видно два слоя.

Состав:

действующее вещество: 1 таблетка содержит каштана конского плодов (*Aesculus hippocastanum* L.) экстракта сухого (1: 8,57) (экстрагент - этанол 50%) 40 мг, что соответствует 20 мг тритерпеновых гликозидов в пересчете на безводный эсцин;

вспомогательные вещества: лактоза моногидрат; натрия кроскармеллоза; магния карбонат легкий; крахмал картофельный; кальция стеарат; смесь для покрытия «Opadry II Green» № 33G 21239.

Лекарственная форма.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, снижающие проницаемость капилляров. Код АТХ С05СХ03.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Точный механизм действия не известен. Доклинические и клинические исследования экстракта плодов конского каштана показали, что действие связано с влиянием на тонус вен и скорость капиллярной фильтрации.

Клинические испытания стандартизированных экстрактов плодов конского каштана показали уменьшение симптомов хронической венозной недостаточности.

Фармакокинетика.

Лекарственное средство содержит различные биологические активные вещества. Фармакокинетические исследования не проводились.

Клинические характеристики.

Показания.

Симптоматическое лечение хронической венозной недостаточности (отеки, варикозное расширение вен, судороги икроножных мышц, боль и ощущение тяжести в ногах).

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые заболевания почек, хроническая почечная недостаточность, детский возраст до 18 лет, беременность и период кормления грудью.

Способ применения и дозы.

Взрослым препарат применять по 1 таблетке (20 мг эсцина) 3 раза в сутки. Таблетки принимают после еды, запивая большим количеством воды.

Длительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и клинической эффективности препарата. Курс лечения обычно составляет 3 месяца, при необходимости длительность курса может быть увеличена.

Побочные реакции.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.

Со стороны кожи, подкожной клетчатки/иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, в т.ч. крапивница, высыпания, зуд, ощущение жара, ангионевротический отек.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, учащенное сердцебиение, артериальная гипотензия.

Со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления, боль в эпигастральной области, тошнота, диарея, рвота.

Частота проявления побочных реакций не известна.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка.

Возможно усиление побочных реакций.

Симптомы передозировки

После употребления в пищу конского каштана наблюдались следующие признаки отравления: беспокойство, сильная диарея, сопровождающаяся рвотой; мидриаз, сонливость, делирий, дыхательные расстройства.

В случае передозировки рекомендовано обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью из-за недостаточности данных относительно безопасности его применения у данной категории пациентов.

Дети.

Лекарственное средство не предназначено для применения у детей до 18 лет.

Особенности применения.

В случае возникновения диспептических явлений рекомендуется прием препарата во время еды.

Препарат нельзя применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.


В случае если возникают аномально сильные жалобы, в особенности на состояние ног, которые проявляются в виде отека, изменения цвета кожи, ощущения напряженности или жара, боли, уплотнений под кожей, следует немедленно обратиться к врачу, так как эти симптомы могут свидетельствовать о серьезных медицинских осложнениях.

При применении препарата следует контролировать функцию почек.

В случае недостаточного или неудовлетворительного симптоматического эффекта в течение 4 недель лечения следует проконсультироваться у врача в отношении других возможных причин отеков.

При применении препарата следует неукоснительно соблюдать рекомендации врача по профилактическим мероприятиям, таких как ношение бандажа, специального белья, охлаждающих компрессов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.



Влияние приема лекарственного средства на способность работать с механизмами не изучалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Препарат может усилить действие антитромботических средств. Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных эффектов.

Следует избегать одновременного применения препарата с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.

Срок годности.

3 года.

Условия хранения. Для защиты от воздействия света и влаги хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 10 таблеток в блистере; 2 или 4 блистера в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель

ПАО «Киевмедпрепарат»

Местонахождение

ПАО «Киевмедпрепарат», Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.