

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БИОСЕЛАК
BIOSELAC

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ
Биоселак, Bioselac

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ
Lactobacillus rhamnosus 573 (Лактобактерии рамнозус 573)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Капсулы вагинальные

КОД ПРЕПАРАТА ПО АТХ
G01AX

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Прочие лекарственные средства, применяемые в гинекологии.

СОСТАВ

1 капсула содержит

Лиофилизат штамма *Лактобактерии рамнозус 573 (Lactobacillus rhamnosus 573)* - не менее 10^8 КОЕ.

Вспомогательные вещества: молоко обезжиренное порошкообразное, сахароза, натрия L-глутамат, крахмал картофельный, магния стеарат, маннитол, титана диоксид, желатин.

Описание: твердые желатиновые капсулы белого цвета, содержащие порошок белого с коричневатым оттенком цвета.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вагинальные капсулы **Биоселак** содержат в качестве активного компонента молочнокислые бактерии *Lactobacillus rhamnosus 573* лиофилизированные, на молочно-сахарном носителе. При введении во влагалище *Lactobacillus rhamnosus 573* проявляет антагонистическую активность по отношению к патогенным бактериям за счет синтеза молочной кислоты, снижая рН вагинальной среды, а также благодаря адгезивным свойствам *Lactobacillus rhamnosus 573* к влагалищному эпителию.

В исследованиях *in vitro* штамм *Lactobacillus rhamnosus 573* продемонстрировал антагонистическую активность в отношении *Gardnerella vaginalis*, *Peptostreptococcus sp.*, *Prevotella intermedia*, *Streptococcus agalactiae*, *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus aureus*, *Salmonella enteritidis*, *Shigella sonnei*, *Clostridium perfringens* mun A, *Pseudomonas aeruginosa*.

Не обладает антагонистической активностью в отношении грибов вида *Candida*.

In vitro штамм *Lactobacillus rhamnosus 573* обладает устойчивостью к ко-тримоксазолу и метронидазолу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Биоселак применяется для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры влагалища после лечения специфических и неспецифических вагинальных инфекций антибактериальными, противотрихомонадными и противогрибковыми лекарственными средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.


ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат хорошо переносится.

В единичных случаях возможны местные аллергические реакции (зуд, чувство жжения, увеличение секреции влагалища).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Для местного применения (интравагинально) после основного курса лечения в соответствии с показаниями.




КСС № 4 от 18.07.2016

Капсулу необходимо вводить глубоко во влагалище, соблюдая все правила личной гигиены.

Биоселак используют по 1 капсуле в сутки (желательно перед сном).

Продолжительность курса составляет 7 – 10 дней.

При необходимости врач может увеличивать продолжительность ~~терапии или назначать повторные курсы лечения.~~



ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ

Назначение препарата в период беременности и лактации возможно по указанию дежурного врача.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Передозировка не ставит под угрозу состояние пациента.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Биоселак не должен использоваться пациентами одновременно с антибактериальными, трихомонацидными или противогрибковыми лекарствами (за исключением метронидазола и ко-тримоксазола), а также в период лечения следует воздерживаться от вагинальных спринцеваний с использованием антисептических растворов, так как они могут снижать эффективность препарата.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В случае серьезных нарушений иммунной системы, применять препарат **Биоселак** необходимо с осторожностью.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К ВОЖДЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА И УПРАВЛЕНИЮ МЕХАНИЗМАМИ

Биоселак не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и использованию механизмов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы

10 капсул вагинальных во флаконе.

1 флакон в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.

Блистеры

10 капсул вагинальных в блистере.

1 блистер в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8°C (в холодильнике).

Срок годности препарата при температуре хранения не выше 25°C составляет 4 недели.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года от даты производства.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Владельцем торговой марки и сертификата регистрации является компания «РОТАФАРМ ЛИМИТЕД», Великобритания
 (“ROTAPHARM LIMITED”, Great Britain).

Изготовлено «Институт биотехнологий, сывороток и вакцин БИОМЕД С.А.» (ИБСС БИОМЕД С.А.);
 Ал. Соснова, 8, 30-224 Краков, Польша.

(“Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines BIOMED S.A.” (IBSS BIOMED S.A.), Al. Sosnowa 8, 30-224 Krakow, Poland).