

Листок-вкладыш: информация для потребителя**Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг****МНН:** Месалазин

Подробно прочитайте данную аннотацию перед тем, как начать применение препарата, потому что в ней содержится важная для Вас информация.

- Сохраните данную аннотацию. Возможно, Вам понадобится прочитать ее еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо еще вопросы, спросите Вашего врача или фармацевта.
- Данный лекарственный препарат выписали Вам. Не передавайте его другим лицам. Он может причинить вред, даже если их симптомы совпадают с Вашими.
- Если какой-либо из побочных эффектов начинает причинять серьезное беспокойство, или если Вы заметите какое-либо нежелательное явление, не указанное в данной аннотации, пожалуйста, сообщите об этом своему врачу.

В данной аннотации:

1. Что из себя представляет препарат Салофальк®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Салофальк®.
3. Применение препарата Салофальк®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Салофальк®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Салофальк®, и для чего его применяют

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг содержит действующее вещество месалазин, противовоспалительный препарат, используемый для лечения воспалительных заболеваний кишечника.

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг используют для:

- лечения острых приступов и предотвращения рецидива хронического воспалительного заболевания толстого кишечника, известного в медицине как язвенный колит, который имеет место в прямой кишке.

2. О чем следует знать перед применением препарата Салофальк®

Не используйте препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг:

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к месалазину, к салициловой кислоте, к салицилатам, таким как Аспирин или любым другим компонентам препарата (см. раздел 6);
- если у Вас тяжелое заболевание печени или почек.

Предупреждения и меры предосторожности

Перед тем, как начать применение данного лекарственного препарата, Вы должны сообщить Вашему врачу:

- если у Вас когда-либо были проблемы с легкими, в особенности, если Вы страдаете бронхиальной астмой;
- если у Вас была аллергия на сульфасалазин, вещество, родственное месалазину;
- если у Вас есть проблемы с печенью;
- если у Вас есть проблемы с почками;
- если у Вас когда-либо появлялась выраженная кожная сыпь или шелушение, пузыри и/или язвы во рту после применения месалазина.

Прочие меры предосторожности

1154 - 2016

Во время лечения Вы будете находиться под тщательным наблюдением со стороны Вашего врача, возможно, у Вас регулярно будут брать кровь и мочу на анализ.

При применении месалазина могут развиваться камни в почках. Симптомы могут включать боль в боковых сторонах живота и кровь в моче. Во время лечения месалазином необходимо пить достаточное количество жидкости.

Сообщалось о появлении серьезных кожных реакций, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, в связи с лечением месалазином. Прекратите применение месалазина и немедленно обратитесь к врачу, если вы заметили какие-либо из симптомов, связанных с этими серьезными кожными реакциями, которые описаны в разделе 4.

Применение других лекарственных препаратов

Пожалуйста, сообщите Вашему врачу, если Вы применяете какие-либо из лекарственных препаратов, перечисленных ниже, поскольку их действие может измениться (лекарственные взаимодействия):

- **Азатиоприн, 6-меркаптопурин или тиогуанин** (препараты, используемые для лечения заболеваний иммунной системы).
- **Определенные лекарства, снижающие свертываемость крови** (лекарства от тромбозов и для разжижения крови, например, варфарин).

Пожалуйста, также сообщите Вашему врачу, если Вы применяете или применяли недавно какие-либо другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты. Вероятно, Вы все равно сможете применять препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг, и Ваш врач сможет решить, что будет лучше для Вас.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что можете быть беременны или планируете иметь ребенка, посоветуйтесь с врачом, прежде чем использовать этот препарат.

Вам следует применять препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг во время беременности только, если Вам назначил их Ваш врач.

Если Вы кормите грудью, Вам следует применять препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг только, если Вам назначил их Ваш врач, потому что лекарственный препарат и его метаболиты могут переходить в грудное молоко.

Вождение автомобиля и управление сложной техникой

Использование препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг либо не оказывает влияние, либо оказывает ничтожно малое влияние на способность водить автомобиль и управлять сложной техникой.

3. Применение препарата Салофальк®

Всегда применяйте препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг в точности так, как прописал Вам врач. Если Вы в чем-то не уверены, посоветуйтесь с врачом.


Как использовать препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг

Всегда используйте препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг в точности так, как прописал Вам врач. Если Вы в чем-то не уверены, посоветуйтесь с врачом.

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг предназначен только для ректального применения.

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг следует вводить в анальный проход. Этот препарат не следует применять перорально или проглатывать.

НД РБ



1154 - 2016

Дозирование

Рекомендуемые дозы:

Взрослые и пожилые люди

Для лечения острых симптомов воспаления, применяйте по два суппозитория препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг 3 раза в день: утром, в середине дня и перед сном (что соответствует 1500 мг дневной дозы месалазина).

При длительном лечении для профилактики рецидивов применяйте по одному суппозиторию препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг 3 раза в день (что соответствует 750 мг дневной дозы месалазина).

Дети

Имеется небольшой опыт применения у детей, данные по эффективности препарата у детей ограничены.

Длительность лечения

Ваш врач решит, как долго Вы будете применять препарат. Длительность лечения будет зависеть от природы, тяжести и динамики Вашего состояния.

Использование препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг должно быть регулярным и систематическим, поскольку только в таком случае можно добиться желаемого терапевтического эффекта.

Если Вам кажется, что эффект от применения препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг слишком сильный или, наоборот, слишком слабый, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу.

Если Вы используете больше препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг, чем следует

Если Вы сомневаетесь, обратитесь к Вашему врачу, чтобы он решил, что предпринять. Если Вы за один раз использовали больше препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг, чем следует, просто продолжите применение далее, как прописано, не уменьшайте следующую дозу.

Если Вы забыли использовать препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг Не увеличивайте следующую дозу препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг.

Если Вы прекратили использовать препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг

Не прекращайте использование данного препарата, пока Вы не поговорите со своим врачом. Если у Вас остались какие-либо еще вопросы о применении препарата, задайте их Вашему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции


Как и другие лекарственные препараты, препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг может вызывать побочные эффекты, хотя проявляются они не у всех.

Лекарственные препараты могут вызывать аллергические реакции, хотя серьезные аллергические реакции встречаются очень редко. Если после использования препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг Вы заметите у себя какой-либо из перечисленных ниже симптомов, немедленно сообщите об этом Вашему врачу:

- аллергическая сыпь на коже;
- лихорадка;
- затрудненное дыхание.

Прекратите применение месалазина и немедленно обратитесь к врачу, если вы заметили какие-либо из следующих симптомов:

- красноватые, не приподнятые над поверхностью кожи, мишеневидные или круглые пятна на туловище, часто с волдырями в центре, шелушение кожи, язвы во рту, горле, носу, на гениталиях и глазах. Этим серьезным кожным высыпаниям могут предшествовать лихорадка и гриппоподобные симптомы.



Если Вы почувствуете сильное недомогание, особенно если оно сопровождается лихорадкой и/или болями горла и рта, прекратите применение препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг и немедленно обратитесь к Вашему врачу.

Очень редко эти симптомы могут быть вызваны снижением количества белых клеток крови (агранулоцитоз). Это может увеличить вероятность серьезной инфекции. У Вас возьмут анализ крови для того, чтобы проверить возможное уменьшение числа белых клеток крови. Важно сообщить Вашему врачу о препарате, который Вы применяете.

Также были зафиксированы следующие побочные эффекты у пациентов, применяющих препараты, содержащие месалазин:

Редкие нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- боли в области живота, диарея, метеоризм, тошнота и рвота;
- головная боль, головокружение;
- боли в груди, затруднение дыхания или отеки конечностей в связи с проблемами с сердцем;
- гиперчувствительность Вашей кожи к солнцу и ультрафиолетовым лучам (фоточувствительность).

Очень редкие нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- изменения функции почек, иногда сопровождающиеся отеками конечностей или болью в боку;
- сильная боль в животе как следствие острого воспаления поджелудочной железы;
- лихорадка, боль в горле или недомогание как следствие изменений формулы крови;
- затруднение дыхания, кашель, свистящее дыхание, тень в легком на рентгенограмме как следствие аллергических и/или воспалительных заболеваний легких;
- сильная диарея и боль в животе как следствие аллергической реакции на присутствие данного препарата в кишечнике;
- кожная сыпь или воспаление;
- боль в мышцах и суставах;
- желтуха или боль в животе как следствие проблем с печенью и выделением желчи;
- потеря волос и облысение;
- онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая нейропатия);
- обратимое снижение продукции спермы.

Неизвестно (частота не может быть оценена из имеющихся данных)

- Камни в почках и связанная с ними боль в почках (см. Также раздел 2)

Сообщения о нежелательных реакциях


Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Салофальк®

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата 3 года. Не применяйте препарат после даты, указанной на блистере и картонной упаковке, или на контейнере. Дата окончания срока годности относится к последнему дню указанного месяца.



6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Что содержит препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг

Действующим веществом препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг является месалазин, в каждом суппозитории препарата Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг содержится 250 мг месалазина. Другие вспомогательные вещества: жир твердый.

Как выглядит препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг, и что находится в упаковке

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг – белые до сероватого цвета торпедообразные суппозитории, однородной консистенции и с неповрежденной гладкой поверхностью.

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг доступен в блистерах по 5 штук, ламинированных ПВХ/полиэтиленом низкой плотности; по 2 блистера вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Держатель регистрационного удостоверения

Др. Фальк Фарма ГмбХ
Ляйненвеберштр. 5
79108 Фрайбург
Германия

Производители

Вифор СА
Филиал «Медихеми Эттингем»
Брюльштрассе 50
4107 Эттинген
Швейцария

Лозан Фарма ГмбХ
Завод в Нойенбурге
Отго-Хан-Штрассе 13
79395 Нойенбург-на-Рейне
Германия

Представитель в Республике Беларусь

Представительство АО «Alpen Pharma AG» в Республике Беларусь
220053, г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
Тел/факс: (+375 17) 3530644



САЛОФАЛЬК®

Листок-вкладыш: информация для потребителя

Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг

НД РБ

МНН: Месалазин

1154 - 2016

Подробно прочитайте данную аннотацию перед тем, как начать применение препарата, потому что в ней содержится важная для Вас информация.

- Сохраните данную аннотацию. Возможно, Вам понадобится прочитать ее еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо еще вопросы, спросите Вашего врача или фармацевта.
- Данный лекарственный препарат выписали Вам. Не передавайте его другим лицам. Он может причинить вред, даже если их симптомы совпадают с Вашими.
- Если какой-либо из побочных эффектов начинает причинять серьезное беспокойство, или если Вы заметите какое-либо нежелательное явление, не указанное в данной аннотации, пожалуйста, сообщите об этом своему врачу.

В данной аннотации:

1. Что из себя представляет препарат Салофальк®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Салофальк®.
3. Применение препарата Салофальк®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Салофальк®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Салофальк®, и для чего его применяют

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг содержит действующее вещество месалазин, противовоспалительный препарат, используемый для лечения воспалительных заболеваний кишечника.

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг используют для:

- лечения острых приступов и предотвращения рецидива хронического воспалительного заболевания толстого кишечника, известного в медицине как язвенный колит, который имеет место в прямой кишке.

2. О чем следует знать перед применением препарата Салофальк®

Не используйте препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к месалазину, к салициловой кислоте, к салицилатам, таким как Аспирин или любым другим компонентам препарата (см. раздел 6);
- если у Вас тяжелое заболевание печени или почек.

Предупреждения и меры предосторожности

Перед тем, как начать применение данного лекарственного препарата, Вы должны сообщить Вашему врачу:

- если у Вас когда-либо были проблемы с легкими, в особенности, если Вы страдаете бронхиальной астмой;
- если у Вас была аллергия на сульфасалазин, вещество, родственное месалазину;
- если у Вас есть проблемы с печенью;
- если у Вас есть проблемы с почками;
- если у Вас когда-либо появлялась выраженная кожная сыпь или шелушение, пузыри и/или язвы во рту после применения месалазина.

Прочие меры предосторожности

1154 - 2016

Во время лечения Вы будете находиться под тщательным наблюдением со стороны Вашего врача, возможно, у Вас регулярно будут брать кровь и мочу на анализ. Цетиловый спирт, входящий в состав препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг может вызвать местное раздражение кожи (например, контактный дерматит).

При применении месалазина могут развиваться камни в почках. Симптомы могут включать боль в боковых сторонах живота и кровь в моче. Во время лечения месалазином необходимо пить достаточное количество жидкости.

Сообщалось о появлении серьезных кожных реакций, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, в связи с лечением месалазином. Прекратите применение месалазина и немедленно обратитесь к врачу, если вы заметили какие-либо из симптомов, связанных с этими серьезными кожными реакциями, которые описаны в разделе 4.

Применение других лекарственных препаратов

Пожалуйста, сообщите Вашему врачу, если Вы применяете какие-либо из лекарственных препаратов, перечисленных ниже, поскольку их действие может измениться (лекарственные взаимодействия):

- **Азатиоприн, 6-меркаптопурин или тиогуанин** (препараты, используемые для лечения заболеваний иммунной системы).
- **Определенные лекарства, снижающие свертываемость крови** (лекарства от тромбозов и для разжижения крови, например, варфарин).

Пожалуйста, также сообщите Вашему врачу, если Вы применяете или применяли недавно какие-либо другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты. Вероятно, Вы все равно сможете применять препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг, и Ваш врач сможет решить, что будет лучше для Вас.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что можете быть беременны или планируете иметь ребенка, посоветуйтесь с врачом, прежде чем использовать этот препарат.

Вам следует применять препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг во время беременности только, если Вам назначил его Ваш врач.

Если Вы кормите грудью, Вам следует применять препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг только, если Вам назначил их Ваш врач, потому что лекарственный препарат и его метаболиты могут переходить в грудное молоко.

Вождение автомобиля и управление сложной техникой

Использование препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг либо не оказывает влияние, либо оказывает ничтожно малое влияние на способность водить автомобиль и управлять сложной техникой.

3. Применение препарата Салофальк®

Всегда применяйте препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг в точности так, как прописал Вам врач. Если Вы в чем-то не уверены, посоветуйтесь с врачом.

Как использовать препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг предназначен только для ректального применения.

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг следует вводить в анальный проход. Этот препарат не следует применять перорально или проглатывать.

Дозирование

Рекомендуемые дозы:

Взрослые и пожилые люди

1154 - 2016

Для лечения острых симптомов воспаления, применяйте ректально один суппозиторий препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг 3 раза в день: утром, в середине дня и перед сном (что соответствует 1500 мг дневной дозы месалазина).

При длительном лечении для профилактики рецидивов применяйте ректально по одному суппозиторию Салофальк®, содержащему 250 мг месалазина, мг 3 раза в день (например, Салофальк® суппозитории ректальные 250 мг).

Дети

Имеется небольшой опыт применения у детей, данные по эффективности препарата у детей ограничены.

Длительность лечения

Ваш врач решит, как долго Вы будете применять препарат. Длительность лечения будет зависеть от природы, тяжести и динамики Вашего состояния. Использование препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг должно быть регулярным и систематическим, поскольку только в таком случае можно добиться желаемого терапевтического эффекта.

Если Вам кажется, что эффект от применения препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг слишком сильный или, наоборот, слишком слабый, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу.

Если Вы используете больше препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг, чем следует

Если Вы сомневаетесь, обратитесь к Вашему врачу, чтобы он решил, что предпринять. Если Вы за один раз использовали больше препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг, чем следует, просто продолжите применение далее, как прописано, не уменьшайте следующую дозу.

Если Вы забыли использовать препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг

Не увеличивайте следующую дозу препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг.

Если Вы прекратили использовать препарат Салофальк® суппозитории 500 мг

Не прекращайте использование данного препарата, пока Вы не поговорите со своим врачом.

Если у Вас остались какие-либо еще вопросы о применении препарата, задайте их Вашему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Как и другие лекарственные препараты, препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг могут вызывать побочные эффекты, хотя проявляются они не у всех.

Лекарственные препараты могут вызывать аллергические реакции, хотя серьезные аллергические реакции встречаются очень редко. Если после использования препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг Вы заметите у себя какой-либо из перечисленных ниже симптомов, немедленно сообщите об этом Вашему врачу:

- аллергическая сыпь на коже;
- лихорадка;
- затрудненное дыхание.

Прекратите применение месалазина и немедленно обратитесь к врачу, если вы заметили какие-либо из следующих симптомов:

- красноватые, не приподнятые над поверхностью кожи, мишеневидные или круглые пятна на туловище, часто с волдырями в центре, шелушение кожи, язвы во рту, горле, носу, на гениталиях и глазах. Этим серьезным кожным высыпаниям могут предшествовать лихорадка и гриппоподобные симптомы.

Если Вы почувствуете сильное недомогание, особенно если оно сопровождается лихорадкой и/или болями горла и рта, прекратите применение препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг и немедленно обратитесь к Вашему врачу.

Очень редко эти симптомы могут быть вызваны снижением количества белых клеток крови (агранулоцитоз). Это может увеличить вероятность серьезной инфекции. У Вас возьмут анализ крови для того, чтобы проверить возможное уменьшение числа белых клеток крови. Важно сообщить Вашему врачу о препарате, который Вы применяете.

Также были зафиксированы следующие побочные эффекты у пациентов, применяющих препараты, содержащие месалазин:

Редкие нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- боли в области живота, диарея, метеоризм, тошнота и рвота;
- головная боль, головокружение;
- боли в груди, затруднение дыхания или отеки конечностей в связи с проблемами с сердцем;
- гиперчувствительность Вашей кожи к солнцу и ультрафиолетовым лучам (фоточувствительность).

Очень редкие нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- изменения функции почек, иногда сопровождающиеся отеками конечностей или болью в боку;
- сильная боль в животе как следствие острого воспаления поджелудочной железы;
- лихорадка, боль в горле или недомогание как следствие изменений формулы крови;
- затруднение дыхания, кашель, свистящее дыхание, тень в легком на рентгенограмме как следствие аллергических и/или воспалительных заболеваний легких;
- сильная диарея и боль в животе как следствие аллергической реакции на присутствие данного препарата в кишечнике;
- кожная сыпь или воспаление;
- боль в мышцах и суставах;
- желтуха или боль в животе как следствие проблем с печенью и выделением желчи;
- потеря волос и облысение;
- онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая нейропатия);
- обратимое снижение продукции спермы.

Неизвестно (частота не может быть оценена из имеющихся данных)

- Камни в почках и связанная с ними боль в почках (см. Также раздел 2)

Сообщения о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Салофальк®

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата 3 года. Не применяйте препарат после даты, указанной на блистере и картонной упаковке, или на контейнере. Дата окончания срока годности относится к последнему дню указанного месяца.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Что содержит препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг

Действующим веществом препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг является месалазин, в каждом суппозитории препарата Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг содержится 500 мг месалазина. Другие вспомогательные вещества: жир твердый, цетиловый спирт, докузат натрия.

Как выглядит препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг, и что находится в упаковке

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг – белые до сероватого цвета торпедообразные суппозитории, однородной консистенции и с неповрежденной гладкой поверхностью.

Препарат Салофальк® суппозитории ректальные 500 мг доступен в блистерах по 5 штук, ламинированных ПВХ/полиэтиленом низкой плотности; по 2 блистера вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Держатель регистрационного удостоверения

Др. Фальк Фарма ГмбХ

Ляйненвеберштр. 5

79108 Фрайбург

Германия

Производители

Вифор СА

Филиал «Медихеми Эттингем»

Брюльштрассе 50

4107 Эттинген

Швейцария

Лозан Фарма ГмбХ

Завод в Нойенбурге

Отто-Хан-Штрассе 13

79395 Нойенбург-на-Рейне

Германия

Представитель в Республике Беларусь

Представительство АО «Alpen Pharma AG» в Республике Беларусь

220053, г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б

Тел/факс: (+375 17) 3530644