




8468 - 2017




Листок-вкладыш
Информация для потребителей

Гербион® сироп первоцвета и тимьяна

Сироп с экстрактом из смеси корней первоцвета и травы тимьяна

Торговое название

Гербион® сироп первоцвета и тимьяна



Общая характеристика

Описание

Сироп коричневого цвета со специфическими запахом и вкусом. Допускается наличие осадка, характерное для веществ природного происхождения.

Состав

В 5 мл сиропа (1 мерной ложке) содержится 3,08 г жидкого водного экстракта смеси (1 : 3,1) первоцвета корней (*Primula veris* L. или / и *Primula elatior* (L.) Hill, *radix*) и тимьяна травы (*Thymus vulgaris* L. или / и *Thymus zygis* L., *herba*), что эквивалентно 0,22 – 0,51 г первоцвета корней и 0,62 г тимьяна травы.

Растворитель для экстракции: вода очищенная.

Вспомогательные вещества: левоментол, сахароза, метилпарагидроксibenзоат (E 218).

Форма выпуска

Сироп

Код классификации лекарственного средства

Отхаркивающие средства.

Код АТХ: R05CA.


Фармакологические свойства

Гербион сироп первоцвета и тимьяна содержит жидкий водный экстракт смеси корней первоцвета и травы тимьяна. Отхаркивающее действие определяется сапонинами первоцвета и эфирным маслом тимьяна.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.



8468 - 2017

Способ применения и дозировка

Дозирование

1 мерная ложка содержит 5 мл сиропа.

Дети

Дети от 4 до 12 лет - по 1 мерной ложке 3 раза в сутки.

Подростки старше 12 лет - по 1 мерной ложке 4 раза в сутки.

Применение сиропа детям до 4 лет не рекомендовано.

Взрослые

Взрослые - по 1 мерной ложке 4 раза в сутки.

Способ применения

Во время лечения рекомендовано обильное питье жидкости (чай или другие теплые напитки), однако, не следует принимать пищу или пить жидкость непосредственно после приема сиропа, так как в таком случае препарат может быть слишком быстро удален со слизистой оболочки полости рта и глотки. Перед употреблением флакон с сиропом следует встряхнуть.

Если симптомы заболевания не проходят через одну неделю после начала приема препарата, то следует проконсультироваться с врачом.

Продолжительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

В случае пропуска очередного приема препарата

Как можно скорее примите пропущенную дозу. Если же наступило время следующего приема, не принимайте двойную дозу препарата, а продолжите прием по обычной схеме.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к активным компонентам сиропа, к растениям, относящимся к роду *Primula* или семейству *Lamiaceae*, а также к любому из вспомогательных веществ препарата

Острый обструктивный ларингит у детей в анамнезе

Бронхиальная астма

Беременность и период лактации

Меры предосторожности

Если во время приема лекарственного средства происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо немедленно обратиться к врачу.

Препарат содержит сахарозу и поэтому не рекомендуется больным с сахарным диабетом.

Следует соблюдать осторожность при назначении лекарственного средства пациентам с гастритом или язвой желудка.

Дети


Сироп не рекомендуется детям младше 4 лет.

Прием с пищей и напитками

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь



8468 - 2017



Нет данных о взаимодействии препарата с продуктами питания. Во время лечения рекомендовано обильное питье жидкости (чай или другие теплые напитки), однако, не следует принимать пищу непосредственно после приема сиропа, так как в таком случае препарат может быть слишком быстро удален со слизистой оболочки полости рта и глотки.

Важная информация о вспомогательных веществах

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с непереносимостью некоторых сахаров перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Метилпарагидроксибензоат может вызывать аллергические реакции (возможно замедленного типа).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Перед началом приёма необходимо сообщить врачу о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо лекарственные средства.

Нет данных о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами.

Беременность и лактация

Перед приемом каких-либо препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Безопасность применения лекарственного средства во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и кормления грудью не рекомендован.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работу с потенциально опасными механизмами

Не установлено влияния препарата на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Передозировка

Не следует превышать рекомендуемые дозы.

При передозировке возможны желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся тошнотой, рвотой и диареей.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Побочное действие

Как и для любого другого препарата, в отдельных случаях возможны побочные реакции.

Классификация частоты развития побочных эффектов согласно Всемирной организации здравоохранения: очень частые ($\geq 1/10$); частые (от $\geq 1/100$ до $< 1/10$); нечастые (от $\geq 1/1\ 000$ до $< 1/100$); редкие (от $\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$);


СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь



8468 - 2017

ГЕРБИОН СИРОП ПЕРВОЦВЕТА И ТИМЬЯНА



очень редкие ($< 1/10\ 000$), частота неизвестна (не может быть оценена по доступным данным).

Частота побочных эффектов перечислена для отдельных

Нарушения со стороны иммунной системы

- частота неизвестна: аллергические реакции, реакции гиперчувствительности (в т.ч. анафилактический шок, отек Квинке).

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

- частота неизвестна: боли в желудке, тошнота, рвота, диарея.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в листке-вкладыше, следует прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

До вскрытия флакона

Хранить при температуре от 15 °С до 30 °С.

Не хранить в холодильнике.

Хранить в недоступном для детей месте.

После вскрытия флакона

Хранить при температуре от 15 °С до 30 °С.

Не хранить в холодильнике.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

До вскрытия флакона

3 года

Не использовать позднее даты, указанной на упаковке.

Дата окончания срока годности относится к последнему дню указанного месяца.

После вскрытия флакона

Сироп следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.

Условия отпуска

Без рецепта врача

Упаковка

150 мл сиропа в стеклянном флаконе с пластиковой крышкой и мерной ложкой в коробке с листком-вкладышем.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.

