


Упаковочный листок-вкладыш: информация для пациента

Перед применением данного лекарственного средства внимательно прочитайте содержание листка-вкладыша.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может возникнуть необходимость перечитать его.
- Если у Вас появятся вопросы, спрашивайте у лечащего врача или фармацевта.
- При усилении симптомов или отсутствии улучшения необходимо обратиться к врачу.
- Если какие-либо побочные эффекты становятся тяжелыми или Вы заметили побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

Содержание:

1. Что такое Фемиклиман уно и для чего он применяется
2. Перед применением Фемиклимана уно
3. Как принимать Фемиклиман уно
4. Возможные побочные эффекты
5. Условия хранения

**Фемиклиман® уно**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки от белого до белого со светло-коричневыми вкраплениями цвета, круглые, выпуклые, с линией разлома на одной стороне; пленочная оболочка должна быть без разрывов.

Действующее вещество: сухой экстракт корневищ цимицифуги (*Cimicifuga racemosa*).

Состав

Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 6,5 мг сухого экстракта корневищ цимицифуги (*Cimicifuga racemosa*) (4,5-8,5:1); среда экстракции: этанол 60 об. %.*

Вспомогательные вещества: целлюлоза порошкообразная, кремния диоксид коллоидный безводный, лактозы моногидрат, магния стеарат, кукурузный крахмал, целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), гипромеллоза, макрогол 4000, титана диоксид (Е 171).

Примечание:

* - экстракционная среда «этанол 60%» применяется исключительно для производства сухого экстракта корневищ цимицифуги и не содержится в конечном продукте.

Содержимое упаковки

Упаковки по 30 и 60 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

Владелец регистрационного удостоверения

Лек д.д., Веровшка 57, Любляна, Словения

Производитель

Салютас Фарма ГмбХ, Германия

1. ЧТО ТАКОЕ ФЕМИКЛИМАН УНО И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

Фемиклиман уно – препарат растительного происхождения для облегчения психоэмоциональных и нейровегетативных проявлений климактерического синдрома.

Наиболее частые симптомы климактерического синдрома: «приливы» жара, потливость, ознобы, сердцебиения, головокружения, перепады давления, гиперемия кожи, парестезии, раздражительность, бессонница, изменения настроения, головные боли, вспышчивость, нетерпимость, нарушение памяти (за счет снижения концентрации внимания), мнительность, снижение либидо.

Расстройство или возобновление менструаций, а также стойкие, неясные симптомы и/или появление новых жалоб, могут свидетельствовать о состояниях, требующих консультации врача и дополнительного обследования.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕМИКЛИМАНА УНО НЕ принимайте Фемиклиман уно

- при повышенной чувствительности (аллергии) к активному веществу или любому из вспомогательных веществ препарата.

Соблюдайте особую осторожность

При наличии заболеваний печени в анамнезе препарат необходимо принимать с осторожностью (см. «Возможные побочные эффекты»).

При появлении признаков заболевания печени (утомляемость, потеря аппетита, желтое окрашивание кожи и склер, боль в верхних отделах живота с тошнотой и рвотой, темный цвет мочи) следует немедленно прекратить прием Фемиклимана уно и обратиться к врачу.

При появлении влагалищного кровотечения или другой симптоматики необходимо обратиться к врачу.

Фемиклиман уно не следует применять одновременно с эстрогенами, кроме случаев, когда это предписано врачом.

Если Вы получали ранее или получаете в настоящее время лечение по поводу рака молочной железы или другой гормонозависимой опухоли, то Вам нельзя применять данный препарат без предварительной консультации врача.

Если на фоне терапии Фемиклиманом уно симптомы заболевания ухудшаются, обратитесь за консультацией к врачу или фармацевту.

Прием других лекарственных средств

О взаимодействиях не сообщалось.

Беременность и грудное вскармливание

Перед приемом любого лекарственного средства посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Фемиклиман уно не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания.

Женщинам детородного возраста следует использовать эффективные методы контрацепции в период лечения данным препаратом.

Управление автотранспортом и работа с механизмами

Исследования влияния на способность к управлению транспортными средствами и работу с механизмами не проводились.

Информация о вспомогательных веществах препарата

Препарат содержит лактозы моногидрат. Если у Вас непереносимость галактозы, дефицит лактазы или нарушение всасываемости глюкозы-галактозы, не следует принимать данный препарат.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ФЕМИКЛИМАН УНО

Если Вы в чем-то сомневаетесь, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

При отсутствии других назначений врача рекомендуется:

принимать по 1 таблетке один раз в день в одно и то же время, запивая достаточным количеством жидкости.

Не принимайте таблетки лежа.

Без рекомендации врача не принимайте Фемиклиман уно более 6 месяцев.

Если Вы приняли больше таблеток, чем следовало

Сообщите врачу о передозировке. Он примет решение о необходимости лечебных мер. При передозировке возрастает вероятность появления побочных эффектов.

Если Вы пропустили прием препарата

Не принимайте двойную дозу для восполнения пропущенного приема.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы по применению данного препарата, спрашивайте у своего врача или фармацевта.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Как и все лекарственные средства, Фемиклиман уно может вызывать побочные эффекты, хотя развиваются они не у каждого.

При применении препаратов на основе цимицифуги встречаются случаи гепатотоксичности (включая гепатит, желтуху, нарушение функциональных печеночных проб). Сообщалось о кожных реакциях (крапивница, зуд, кожная сыпь), отеках лица, периферических отеках, увеличении веса, жалобах со стороны желудочно-кишечного тракта (напр., диспепсических расстройствах, диарее). Частоту вышеуказанных побочных эффектов невозможно оценить по имеющимся данным.

При появлении побочных эффектов прекратите прием лекарства и обратитесь к врачу.

Если какие-либо побочные эффекты становятся тяжелыми или Вы заметили побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 30°C.

Не применяйте лекарственное средство по истечении срока годности, отпечатанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь